

برنیسکون®

۲۴۰ میلی لیتر سوسپانسیون خوراکی
باطعم نعنا

هر ۵ میلی لیتر حاوی:

- سدیم آلزینات ۲۵۰ میلی گرم
- کلسیم کرینات ۸۰ میلی گرم
- سدیم پیکرینات ۱۳۳/۵ میلی گرم

کاربرد درمانی:

فرآورده برنیسکون® حاوی کرینات کلسیم، سدیم آلزینات و سدیم پیکرینات است و به عنوان آنتی رفلاکس در رفع علائم بیماری برگشت محتویات اسیدی معده به مری (رفلاکس) کاربرد دارد. بعد از مصرف برنیسکون® سد محافظی در برابر بازگشت محتویات اسیدی معده به مری ایجاد می شود.

برنیسکون® برای درمان علائم رفلاکس اسید معده (رفلاکس گاسترواؤزوفال) شامل بازگشت اسید به پشت گلو و سوزش سر دل که معمولاً بعد از صرف وعده های غذایی اتفاق می افتد موثر است.

مقدار و روش مصرف شربت برنیسکون®:

- قبل از مصرف فرآورده بررسی نمایند در بتری فرآورده باز نشده باشد.
- **بزرگسالان و کودکان بالای ۱۲ سال:** یک تا دو قاشق غذا خوری (۱۰-۲۰ میلی لیتر) بعد از غذا و قبل از خواب، و حداکثر چهار بار در روز استفاده نمایند.
- **در کودکان کمتر از ۱۲ سال:** فقط با توصیه پزشک مصرف شود.
- مصرف بیش از حد این فرآورده ممکن است موجب احساس خفیف نفخ و ناراحتی در شکم شود.
- در صورت نیاز با پزشک یا دکتر داروساز مشورت کنید.
- اگر مصرف فرآورده را فراموش کردید لازم نیست دوز مصرفی بعدی را دو برابر کنید.
- قبل از باز کردن در فرآورده، بطری را به خوبی تکان دهید.

مکانیسم اثر:

بعد از مصرف برنیسکون® طبق مقدار توصیه شده، سدیم آلزینات موجود در این محصول به سرعت با اسید معده واکنش نشان می دهد و یک ژل اسید آلزینیک با pH تقریباً خنثی تشکیل می دهد که به سرعت و به طور موثر بر روی محتویات معده شناور می شود و تا ۴ ساعت مانع رفلاکس معده به مری می شود. در موارد شدید، این ژل شناور همراه با محتویات معده به مری برگشته و اثری آرام بخش ایجاد می نماید. دو ماده پیکرینات سدیم و کرینات کلسیم نیز به عنوان ضد اسید اثر می کنند و در بهبود تسکین علائم ناشی از اسید معده مفید هستند.

موارد منع مصرف:

در صورت وجود سابقه حساسیت به این فرآورده و یا هر یک از اجزای تشکیل دهنده از مصرف فرآورده خودداری نمایید.

بارداری و شیردهی:

در دوران بارداری و شیردهی، تحت نظر پزشک مصرف شود.

احتیاط مصرف:

- اگر علائم رفلاکس پس از ۷ روز از زمان مصرف این محصول ادامه داشت با پزشک خود مشورت کنید.
- در صورتی که پزشکتان رژیم غذایی کم نمک (کم سدیم) برایتان تجویز کرده است، قبل از استفاده از این محصول، با پزشک خود مشورت نمایید. (مخصوصاً در صورت نیاز به استفاده طولانی مدت از این محصول)

- این فرآورده حاوی ملح سدیم ۲۸۵/۲ میلی گرم سدیم در هر دوز ۲۰ میلی لیتری) است و حداکثر توصیه مصرف روزانه این فرآورده حاوی ۱۱۴/۰/۸ میلی گرم سدیم می باشد، که معادل ۵/۷٪ حداکثر مقدار سدیم مصرفی روزانه در بزرگسالان می باشد.
- در بیماران کلیوی و در بیماران با نارسایی کلی یا احتیاط و تحت نظر پزشک مصرفی گردد.
- هر ۵۰ میلی لیتر از این فرآورده حاوی ۱۶۰ میلی گرم کرینات کلسیم است. لذا مصرف این فرآورده در بیماران با غلظت بالای سرمی کلسیم، نفروکلسینوز (رسوب نمک کلسیم در بافت کلیه) یا پسیت تحت نظر پزشک و با پایش بیمار باشد.

سایر داروها با برنیسکون®

از مصرف سایر داروها دو ساعت قبل یا بعد از این دارو خودداری ننمایند. قبل از مصرف هر یک از داروهای زیر با برنیسکون® یا پزشک یا داروساز خود مشورت نمایند:

آنتی هیستامین ها، آنتی بیوتیک ها (آنتراسایکلین ها و کینولون ها مانند سیپروفلوکساسین)، فرآورده های حاوی آهن، ضد قارچ ها مانند کتوکونازول، دیگوسین و بتا بلوکرها، پی سیلایم، گلوکوکورتیکوئید، نوروپتیک، هورمون های تیروئید، کلروکین، استراموسیتین و بیس فسفونات

عارضه جانبی:

واکنش آلرژیک به مواد تشکیل دهنده ممکن است به ندرت اتفاق بیفتد (کمتر از ۱ در ۱۰،۰۰۰ بیمار). علائم واکنش آلرژیک ممکن است شامل: بثورات پوستی، خارش، مشکل در تنفس، سرگیجه یا تورم صورت، لب ها، زبان یا گلو باشد. در صورت مشاهده این عوارض یا هر گونه عوارض جانبی دیگر، مصرف فرآورده را قطع کنید و بلافاصله به پزشک خود مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری:

- در جای خشک و خنک و دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد و دور از نور نگهداری شود.
- دور از دسترس کودکان نگه داری شود.
- از بوی زردگی و سرما محافظت شود.
- پس از تاریخ انقضاء درج شده روی فرآورده از مصرف آن خودداری فرمایید.

مواد جانبی:

کربومر، سوربیتول، گلیسرین، پتاسیم سوریات، اسانس نعنا

دارنده پروانه ساخت:

شرکت نویاویژن آریان / تهران-ایران

BURNISCON®

Natural Product

240 ml Oral Suspension
with peppermint flavor



Each 5 ml of Burniscon® consists of:

Sodium Alginate	250 mg
Calcium Carbonate	80 mg
Sodium Bicarbonate	1335 mg

Therapeutic Indication:

Burniscon® Suspension belongs to the family of locally acting antacids. Burniscon® is consist of Calcium Carbonate, Sodium Alginate and Sodium Bicarbonate and is used as reflux suppressant to treat return of acidic contents from the stomach to the esophagus (Reflux). After using Burniscon® suspension, a protective layer forms that floats on top of the stomach contents. This layer acts as a barrier preventing reflux and keeping the stomach contents away from the lining of the food pipe to relieve the symptoms of heartburn and acid indigestion. Burniscon® suspension is used for the treatment of Gastro-Esophageal Reflux which includes regurgitation and heartburn, which usually occurs after meals.

Dosage and Method of Administration:

- Before using the product make sure the bottle is sealed.
- Adults and children above 12 years: Take 10-20 ml (one to two 10 ml spoonfuls) after the meal and before bed with maximum amount of 4 times in a day.
- Children below 12 years: To be used only on the advice of a physician.
- Using more than recommended dose may cause mild feeling of bloating & gastric discomfort.
- Consult your physician or pharmacist in case it is needed.
- If you forgot to use the product. Do Not double the next dose.
- Shake well before use.

Mechanism Of Action:

After using Burniscon® according to the recommended dose. Sodium Alginate reacts with gastric acid and forms an alginic acid gel with neutral PH which floats on the content of the stomach and prevents the acid reflux from stomach to esophagus for 4 hours. In the severe cases which there is a chance of return of stomach content to esophagus, the produced gel will be floating on top of the content of the stomach when returning back to esophagus.

The two substances Sodium Bicarbonate and Calcium Carbonate also act as antacids and are useful in improving the relief of symptoms caused by stomach acid.

Contraindication:

Avoid using the product if you have a history of allergy to this product or any of its components.

Pregnancy and breastfeeding:

Use under the supervision of a physician during pregnancy & breastfeeding.

Precautions:

- If your reflux symptoms were not relieved within 7 days of using the product, consult with your physician.
- If your doctor has prescribed a low salt (low sodium) diet for you, consult your doctor before using this product (especially if you need to use this product for a long time). This product contains sodium salt (2852 mg sodium per 20 ml dose), and the maximum recommended daily intake of this drug contains 11408 mg of sodium, which is equivalent to 57% of the maximum amount of sodium consumed daily in adults.
- In patients with heart or renal failure, Burniscon® should be used with caution and under the supervision of a doctor.
- Each 10 ml of this product contains 160 mg of Calcium Carbonate. Therefore, the use of this product in patients

with high serum calcium concentration, nephrocalcinosis [calcium salt deposition in the kidney tissue] should be under the supervision of a doctor and patient monitoring.

Other Medicines:

- Avoid using other medicines 2 hours before and after using Burniscon®.
- Before Taking Burniscon® with any of the below listed medicines, consult with your physician or pharmacist. Antihistamines, Antibiotics [Tetracyclines and Quinolones like Ciprofloxacin], Iron preparation, Antifungals like Ketoconazole, Digoxin and Beta blockers, Penicillamine, Glucocorticoid, Neuroleptics, Thyroid hormones, Chloroquine, Estramustine and Bisphosphonates

Possible Side Effects:

Allergic reactions to ingredients of Burniscon® are rare (1 out of 100000) to happen.

These symptoms may include skin rashes, difficulty in breathing, dizziness or swelling of the face, lips, tongue or throat. If you experience these or any other side effects, stop taking the product and contact your doctor immediately.

Storage Condition:

- Store in a dry and cool place below 30°C and away from light.
- Keep out of the reach of children.
- Protect from freezing and cold.
- Do not use the product after the Expiration date written on the product.

Excipients: Carbomer, sorbitol, glycerine, potassium sorbate, peppermint flavour.

Marketing Authorization Holder:

Noya Vision Aryan / Tehran-Iran

 www.noyavision.ir  +9821-88213979

 info@noyavision.com