

این دارو در افرادی که دچار عدم تحمل قند شیر (لاکتوز) هستند، مصرف نشود.

قرص خط دار ماینوکسیدیل ۲/۵ میلی گرم

این دارو حاوی ماینوکسیدیل است که از دسته داروهای "گشادکننده عروق" می باشد.

این دارو می تواند برای درمان فشار خون بسیار بالا (هایپرتانسیون) استفاده شود و با گشاد کردن عروق خونی سبب کاهش فشار خون شود.

◀ نحوه مصرف:

– قرص نویکسیل® را به طور کامل با آب بلعید.
– قرص های ۲/۵ میلی گرمی را می توان از خط شکستن قرص به دوزهای مساوی تقسیم کرد.
– بعد از هر بار مصرف، درب بطری را محکم ببندید.

◀ میزان مصرف:

– بدون مراجعه به پزشک، مصرف دارو را قطع نکنید یا دوز مصرفی خود را تغییر ندهید. تغییر دوز دارو بایستی با رعایت فواصل زمانی و تحت نظر پزشک صورت گیرد.

– مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند، اما مقدار مصرف معمول دارو به شرح زیر است:

کودکان ۱۲ سال و کوچکتر:

– دوز تجویزی نویکسیل® در کودکان به وزن کودک بستگی دارد و توسط پزشک متخصص تعیین می شود.

بزرگسالان و کودکان بالای ۱۲ سال:

– دوز شروع معمول ۵ میلی گرم در روز است. پزشک ممکن است در صورت نیاز برای کنترل بهینه فشار خون دوز مصرفی را به تدریج افزایش دهد.

افراد مسن:

برای بزرگسالان بالای ۶۵ سال، دوز شروع معمول ۲/۵ میلی گرم در روز است.

◀ موارد منع مصرف:

– حساسیت به ماینوکسیدیل یا هر یک از ترکیبات دیگر این دارو
– اگر فشارخون بالا ناشی از هورمون های تومور (فئوکروموسیتوم) باشد.
– در ترکیبات این دارو از لاکتوز استفاده شده است. لذا

◀ هشدارها و احتیاطها:

– این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران جدا خودداری نمایید.

– این دارو در بیماران مبتلا به نارسایی کلیه و تحت همودیالیز بایستی با احتیاط و تحت نظر پزشک متخصص مصرف شود. این بیماران ممکن است به دوزهای کمتری از نویکسیل® نیاز داشته باشند.

– مصرف این دارو در افرادی که دچار نارسایی قلبی هستند (ممکن است احساس تنگی نفس، خس خس سینه یا خستگی کنند و ممکن است مچ پاها متورم شوند) یا سابقه حمله قلبی دارند، بایستی با احتیاط و تحت نظر پزشک متخصص صورت گیرد.

– مصرف این دارو ممکن است در برخی از بیماران سبب التهاب غشای اطراف قلب (پریکاردیت) یا تجمع مایع در زیر غشای اطراف قلب (تامپوناد قلبی) شود. پزشکتان باید این موارد را به دقت تحت نظر داشته باشد.
– اگر قصد انجام تست ECG (نوار قلب) یا آزمایش خون را دارید، به پزشکتان یادآوری کنید که نویکسیل® مصرف می کنید.

– قرص های نویکسیل® ممکن است سبب احتباس آب و نمک در بدن و یا افزایش ضربان قلب شوند. به منظور جلوگیری از این مشکلات، پزشک ممکن است از سایر داروهای ضد فشار خون و دیورتیک (مدر) به همراه نویکسیل® استفاده نماید.

اگر پزشکتان رژیم غذایی کم نمک برای شما در نظر گرفته است، آن را با دقت رعایت کنید. اگر بیش از ۱ تا ۱/۵ کیلوگرم وزن اضافه کردید، به پزشکتان اطلاع دهید. علت آن می تواند تجمع مایع اضافی در بدن شما باشد.
– مصرف این دارو ممکن است سبب افزایش رشد مو (هایپرتریکوزیس) شود که ممکن است با ادامه درمان فروکش کند. این عارضه پس از قطع درمان برگشت پذیر است اما ممکن است یک تا شش ماه طول بکشد.

– در صورتی که با مصرف این دارو دچار احساس ضعف یا سرگیجه شدید، از رانندگی و کار با ماشین آلات خودداری نمایید.

◀ تداخلات دارویی:

– اگر داروی دیگری مصرف می کنید یا اخیراً مصرف کرده اید یا ممکن است مصرف کنید، به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید.

همچنین مهم است که هر دارویی که برای کاهش فشار

خون خود مصرف می‌کنید به پزشکستان اطلاع دهید. این داروها ممکن است به علت افت شدید فشار خون با نوبیکسیل* تداخل ایجاد کنند. به ویژه اگر گوانتیدین یا بتانیدین مصرف می‌کنید، به پزشک خود اطلاع دهید. پزشک شما را از زمان و نحوه قطع دارو مطلع می‌نماید.

سایر تداخلات:

- آمفامین ها، باربیتورات ها مانند فنوباریتال، ترکیبات والپروات
- یوهمبین، داپوکستین، آلفوزوسین، داروهای مهارکننده فسفودی استراز ۵ مثل سildenafil، تادالافیل - آنالوگ های پروستاگلین
- داروهای ضد روان پریشی (آنتی سایکوتیک نسل ۲ آتپیکال) مانند کلوزاپین، آریپیپرازول، الانزاپین، کوئتیاپین - لوودوپا، متیل فنیدیت
- پنتوکسی فیلین، مولسیدومین، نیکوراندیل
- پروبنسید، بریمونیدین، آمیفوستین، آتانانایر، اوبینوتوزوماب

« بارداری و شیردهی:

- اگر باردار هستید یا در دوران شیردهی هستید به پزشک خود اطلاع دهید. همچنین اگر در حین مصرف نوبیکسیل* متوجه بارداری شدید سریعاً به پزشک خود اطلاع دهید. مصرف نوبیکسیل* در دوران بارداری توصیه نمی‌شود.
- ماینوکسیدیل در شیر مادر ترشح می‌شود لذا مصرف نوبیکسیل* در دوران شیردهی توصیه نمی‌شود.

« مصرف بیش از حد (overdose):

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار تجویز شده، سریعاً به پزشک یا مراکز درمانی مراجعه نموده و داروهای خود را همراه ببرید.

« اگر مصرف دارو را فراموش کردید:

اگر مصرف قرص را فراموش کردید، از مصرف دوز فراموش شده صرف نظر کنید و دوز بعدی را طبق روال عادی مصرف کنید.
برای جبران دوز فراموش شده از دو برابر کردن دوز مصرفی خودداری ننمایید.

« عوارض جانبی احتمالی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته گردد. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود ولی در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

عوارض جدی:

در صورت بروز عوارض زیر، سریعاً به پزشک مراجعه نمایید:
- خس خس سینه، تنگی نفس و خستگی (به خصوص در افراد با سابقه مشکلات قلبی)
- بروز درد در قفسه سینه (آنژین) یا بدتر شدن آن
- احساس ضعف یا سرگیجه (به خصوص زمانی که ایستاده‌اید)
- افزایش وزن یا تورم انگشتان دست یا مچ پاها

شایع:

- افزایش ضربان قلب، پریکاردیت (التهاب پوششی که قلب را احاطه کرده)، تغییرات غیر طبیعی در الکتروکاردیوگرام (ECG)، تجمع مایع در اطراف قلب
- هایپرتریکیوزیس (افزایش رشد مو)

نادر:

- سندرم استیونز جانسون: نوعی بیماری نادر در پوست و مخاط بدن است که با تب، التهاب مخاط بینی و سپس با التهاب پوست و بروز ضایعات پوستی دردناک در نواحی لب ها، دهان و دستگاه تناسلی همراه است. در صورت بروز این علائم، سریعاً به پزشک مراجعه نمایید.

« شرایط نگهداری:

- دارو در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد و دور از نور و رطوبت نگهداری شود.
- دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری کنید.
- دارو را در بسته بندی اصلی خود نگهداری ننماید.
- دارو را پس از تاریخ انقضای درج شده روی بسته بندی استفاده نکنید.

« مشخصات محصول و نحوه عرضه:

هر قرص خط دار نوبیکسیل* ۲/۵ حاوی ۲/۵ میلی گرم ماینوکسیدیل می‌باشد.

نوبیکسیل* به صورت بطری ۶۰ عددی همراه با یک عدد برگه راهنما در یک جعبه مقوایی توسط شرکت نوپا ویژن آریان عرضه می‌گردد.

« تاریخ آخرین بازننگری:

ژانویه ۲۰۲۵ براساس اطلاعات فعلی محصول تهیه شده است.

« رفرنس:

1- <https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.4294.pdf>
2- Drug Fact and Comparisons 2017, Pages 1131-1132-1133-3694

« شرکت صاحب پروانه: نوپا ویژن آریان / تهران - ایران
« صدای مشتری (فارماکوویزیلانس): ۰۲۱-۸۸۲۱۳۹۷۹